

Грип

Публикувано от **dannyboy** на **27.04.2010**

Грип

Заболяването се причинява от три групи грипни вируси - **А, В и С**. Те бързо загиват при нагряване и изсушаване, но са по-устойчиви при ниски температури, което обяснява по-голямото разпространение на грипа през студените месеци.

Грипът се предава по въздушно-капков път чрез говорене, кихане или кашляне. Грипните вируси притежават способност да променят антигенния си състав. Това обяснява и честите рецидиви на болестта у едно и също лице, тъй като не се създава продължителен имунитет. Попадналите в дихателните пътища вируси навлизат в епителните клетки на дихателната лигавица и ги разрушават. Развива се възпалителен процес, който засяга цялата дихателна лигавица в дълбочина с увреждане на кръвоносните съдове и поява на оток и точковидни кръвоизливи. Болестта подтиска имунната реактивност, създавайки условия за възникване на усложнения от бактериален произход. Инкубационният период е кратък - от 12 до 48 часа. Болестта започва остро, с втриване, покачване на температурата до 39-40 градуса С и изпотявания. Болните са отпаднали, оплакват се от болки в очите, по мускулите и ставите. Възпалението по дихателните пътища предизвиква кашлица. Лигавицата на носоглътката е зачервена и покрита с точковидни кръвоизливи. Понякога се отделят храчки, примесени с кръв. След 3-4 дни температурата се нормализира и постепенно възпалителните промени изчезват. Опасна е мълниеносната форма на грипа. При нея телесната температура рязко се покачва до и над 40 градуса С, появяват се гърчове, тежки нарушения на кръвообращението и церебрална кома. У деца и възрастни, както и у лица с хронични заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система грипът протича по тежко, като се усложнява с развитие на пневмония, миокардит, дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност. Лечението се състои в назначаване на аналгетици, витамин С, антипиретици, римантидин, гама-глобулин, топли чайове /шипка/. По предписание се прилагат антибиотици и химиотерапевтици, кордиотоници и други медикаменти. Прогнозата на неусложнения и нетоксичен грип е добра. Прогнозата на токсичен грип и настъпили усложнения е сериозна. Профилактиката се състои в строга изолация на болните. При епидемична обстановка се прилага с успех притивогрипна ваксина. Също с профилактична цел е целесъобразно прилагането на имуноглобулини и витамин С в дози 1 грам дневно.

Парагрип

Парагрипът се причинява от парагрипни вируси. Заболяването се разпространява по въздушно капков път от болните и от здравите вирусоносители. Те отделят вирруса при кашляне, кихане и

говорене заедно със слюнчените капки в околната контактна среда. Вирусът прониква и се размножава в лигавицата на дихателните пътища - носоглътката, трахеята, бронхите, където причинява възпалителна реакция. Първите признаци се наблюдават 3-6 дни след инфектирането. Заболяването започва с покачване на телесната температура до 38 градуса С, гърлобол и суха кашлица. По-тежко е протичането у деца, поради запушване на носа и затруднено дишане. Лечението е подобно на това на грипа. Рядко настъпват усложнения. Прогнозата е добра. У деца при състояния на затруднено дишане и закъсняло лечение прогнозата е сериозна. Профилактиката се състои в същите мероприятия, както при грипното заболяване. Ефикасна ваксина срещу парагрипа понастоящем все още не е създадена.

Грип
Powered by
Bukvar.bg

Image not found

© 2010-2024