

Коремен тиф, Паратиф - А и Паратиф - В

Публикувано от dannyboy на 27.04.2010

Коремен тиф, Паратиф - А и Паратиф - В

Тези заболявания се причиняват от бактерии, разновидност на салмонелните бактерии. Те са грам отрицателни, пръчковидни и ресничести. Бактериите притежават сложна антигенна структура и отделят ендотоксин при разпадането си, който уврежда почти всички органи. Заразяването става при контакт с болен или здрав бактерионосител, които отделя болестотворни бактерии чрез изпражненията си, откъдето при замърсени условия попадат у здрав човек чрез замърсена храна, чрез замърсена вода или мухи. Бактериите попадат в храносмилателния канал и през чревната лигавица проникват в лимфната мрежа, регионалните лимфни възли и кръвта. По-нататък те достигат до черния дроб, далака, костния мозък и по-далечните лимфни възли в организма. Инкубационния период е 7-21 дни.

Болестните признаци са:

постепенно повишаване на телесната температура, която за 4-6 дни достига 39-40 градуса С и така се задържа за две-три седмици, обща отпадналост, главоболие, безсъние, метеоризъм. В по-тежките случаи болните бълнуват и имат халюцинации. Езикът е сух, покрит с кафяв налеп. На 10-11-тия ден от болестта се появяват характерните за тифа коремни обриви, съставени от розеоли. Те представляват малки червени петна с големина 2-3 мм, разположени по кожата в горната част на тялото и по корема. Черният дроб и далакът се увеличават. Пулсът е забавен и мек. В началния период на заболяването има запек, а впоследствие се появява умерена диария, като изпражненията са кашави и понякога примесени с кръв. След 3-4-тата седмица температурата започва да се нормализира, общото състояние се подобрява и започва възстановителен период, който продължава около 2-3 седмици.

Коремният тиф не винаги протича по подобен начин. В по-леки случаи температурата не се покачва над 39 градуса С и другите признаци са по-слабо изразени и по-бързо настъпва възстановителния период. В по-тежките случаи заболяването започва бурно, с тежко нарушено съзнание, достигащо до делир и кома със смъртен изход.

Паратиф-А се среща рядко у нас. Инкубационният период е по-кратък - от 2 до 10 дни, температурата не е постоянно повишена и болестта протича с хрема, кашлица, зачервяване на носоглътката и конюнктивите.

Паратиф-В също протича по-леко и пократкотрайно от коремен тиф. Инкубационният период е 3-10 дни и признаците са като при гастрит и ентерит.

В хода на **коремния тиф** могат да настъпят тежки усложнения-нервни кръвоизливи и перфорации /пробив на черво/. При такива усложнения температурата спада, артериалното налягане рязко се понижава, коремната болка става остра и режеща, а в изпражненията се установява кръв.

Лечението се провежда в инфекциозно болнично заведение. Прилагат се широкоспектрни антибиотици и субституиращи коктейли, съдържащи соли разтвори, глюкоза, антипиретици, спазмолитици, аналгетици и други лекарства. В началото се назначава течна-кашавена щадяща диета, която по-нататък в хода на заболяването постепенно се разширява. Настъпване на усложнения - чревен кръвоизлив или чревна перфорация изискват спешна оперативна намеса. Прогнозата е добра. При по-тежко протичане и при усложнения тя се влошава. Болните се лекуват до пълно бактериално оздравяване, за да се избегне опасно бактерионосителство. Профилактиката се състои в системно лечение на здрави бактерионосители, поддържане на висока лична, битова, професионална хигиена. При епидемична обстановка и по показание се извършва имунизация с противотифна ваксина сред застрашени контингентни групи от населението.